

FECAVA – Recommandations pour l'hygiène et le contrôle des infections dans les établissements de soins vétérinaires



AVEC LE SOUTIEN DE



PREVENIR LES INFECTIONS

La mise en œuvre de mesures d'hygiène efficaces est essentielle pour prévenir et éviter la transmission des infections nosocomiales aux animaux et à l'homme aussi bien au sein des structures vétérinaires que dans le domaine public.

SE NETTOYER ET SE DESINFECTER LES MAINS

La mesure la plus importante pour le contrôle des infections nosocomiales dans les établissements de soins vétérinaires

SE LAVER LES MAINS

- En début et fin de journée de travail.
- Après s'être rendu aux toilettes.
- Avant et après avoir mangé ou fumé.
- Lorsqu'elles sont visiblement souillées
- Après manipulation des liquides et excréments d'origine animale.
- Avant tout acte aseptique ou invasif en association avec une désinfection.

SE DESINFECTER LES MAINS

(Utiliser des solutions hydro-alcooliques à 70-90%)

- Après les avoir nettoyées et séchées.
- Avant et après manipulation de chaque patient.
- Avant et après avoir mis des gants.
- Avant de toucher les équipements, les poignées de porte ou les claviers.


Ne porter ni bijoux (bague, bracelet), ni montre bracelet; vernis à ongle ou faux ongles interdits. Les ongles doivent rester courts et propres.



UTILISER DES GANTS

- Lors de manipulation d'animaux malades ou porteurs d'une maladie contagieuse ou suspecte de l'être y compris en cas d'infestations parasitaires.
- Lors de manipulation d'animaux atteints d'infection résistante aux antimicrobiens prouvée ou suspectée.
- Lors de contact avec toute blessure.
- Lors de contact potentiel avec sang, liquides corporels, sécrétions, excréments, et muqueuses.
- Pendant la chirurgie ou quand l'asepsie est nécessaire (gants stériles).
- Changer de gants entre chaque patient et lorsque les gants sont visiblement souillés et contaminés.
- Changer de gants lors du passage d'actes sales à des actes propres sur un même patient.
- Changer de gants avant de toucher tout équipement, les poignées de portes et les claviers.

Porter des gants ne remplace pas l'hygiène des mains!



FORMER LE PERSONNEL VETERINAIRE

Former et encourager l'ensemble du personnel à la compréhension et à l'application des bonnes pratiques d'hygiène.

Une hygiène rigoureuse n'est pas difficile à respecter si chacun est conscient de son importance.

- Mettre au point des protocoles d'hygiène (à afficher bien en vue) et désigner un membre du personnel responsable de la promotion et de l'application des bonnes pratiques d'hygiène.
- Organiser une formation approfondie du personnel en interne et encourager la participation à la formation continue sur l'hygiène.



GERER LES DECHETS

Trier les déchets en fonction des risques pour la santé humaine et animale.

Utiliser systématiquement les récipients, les services de transport et les procédures de traitement des déchets approuvés par les Nations Unies.

- **Déchets tranchants, piquants, perforants:** récipient rigide ne contenant aucun liquide.
- **Déchets à risque infectieux:** sacs (jaunes) pour les matériels contaminés mous, les gants, blouses, pansements, écouvillons et compresses.
- **Déchets à risques (cytotoxiques):** récipient rigide muni d'un couvercle noir.
- Cadavres d'animaux et pièces molles : à placer dans des sacs plastiques afin d'éviter la fuite de liquides biologiques. A déposer dans une pièce froide ou au congélateur.
- **Déchets domestiques** (déchets sans risques), par exemple les recyclables propres. Respecter la législation locale pour l'enlèvement.



NETTOYER ET DESINFECTER LES LOCAUX

Utiliser des produits nettoyants et désinfectants conformes à la réglementation applicable aux locaux vétérinaires et suivre les recommandations d'utilisation. Porter des gants. Pour les équipements, suivre les recommandations des fabricants.

SURFACES ET EQUIPEMENTS

- Nettoyer et désinfecter avant et après chaque patient et quand ils sont visiblement souillés et contaminés.
- Nettoyer et désinfecter quotidiennement ou régulièrement les poignées de portes, claviers, interrupteurs électriques et téléphones.

ESPACES COMMUNS (HALL D'ENTRÉE, ACCUEIL, SALLE D'ATTENTE ET COULOIRS)

- Nettoyer et désinfecter quotidiennement et quand ils sont visiblement souillés et contaminés.

SALLES DE SOINS, ZONES D'ISOLEMENT ET DE SOINS INTENSIFS

- Nettoyer et désinfecter avant et après chaque patient et quand elles sont visiblement souillées et contaminées.



PORTER DES VETEMENTS DE PROTECTION

Pour maintenir la propreté des bras et avant-bras, des blouses et casaques à manches courtes doivent être portées en permanence lors de manipulation des patients. Les tenues de protection ne doivent pas être revêtues en dehors des lieux de travail.

VETEMENTS DE PROTECTIONS COMPLEMENTAIRES

Masques, calots, blouses et gants stériles doivent être utilisés lors d'interventions chirurgicales et d'actes invasifs.

Tabliers en plastique, gants et masques sont nécessaires lors de manipulations de:

- Patients atteints ou suspects d'être atteint d'une maladie contagieuse.
- Liquides biologiques et sécrétions potentiellement contaminés.

Changer les vêtements de protection complémentaires:

- Entre chaque patient.
- Lors de déplacements entre les salles de soins, les zones d'isolement et de soins intensifs.



EDUQUER LES PROPRIETAIRES D'ANIMAUX DE COMPAGNIE

- Pour assurer de bonnes pratiques d'hygiène lors des consultations puis au contact de leur animal à leur domicile.
- Pour renforcer les efforts de l'équipe vétérinaire ayant pour but d'améliorer l'hygiène et l'usage responsable des antimicrobiens en insistant sur le respect des traitements prescrits.
- Pour mieux faire comprendre les conséquences sur la santé publique des infections zoonotiques et résistantes aux antimicrobiens.



LAVER VETEMENTS ET COUCHAGES

- Casaques et blouses – quotidiennement et quand ils sont visiblement souillés ou contaminés.
- Couchages et couvertures des animaux – entre chaque patient et quand ils sont visiblement souillés ou contaminés.
- Enlever les salissures contaminantes les plus visibles avant lavage (porter des gants).
- Laver à 60°C et sécher à température élevée pour éliminer les agents infectieux.
- Maintenir une séparation nette entre les zones propres et sales dans la laverie pour éviter les contaminations croisées.

